

کولیت سیتومگالوویروس با نمای آندوسکوپی

مشابه کولیت پسودوممبرانو در بیماری بافت همبند

محمد رضا پاشایی^۱، ناصر ابراهیمی دریانی^۲، حسین اژدرکش^۳، میترا عاملی^۴

^۱ دستیار بیماری‌های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۲ استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی(ره)، تهران، ایران

^۳ استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، تهران، ایران

^۴ استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، تهران، ایران

چکیده

عفونت سیتومگالوویروس (CMV)* می‌تواند موجب کولیت شود. کولیت ناشی از سیتومگالوویروس به صورت تب، کاهش وزن، بی‌اشتهاای و درد شکم تظاهر پیدا می‌کند. اسهال آبکی انفجاری می‌تواند به عنوان تنها تظاهر بیماری باشد. معمولاً تشخیص عفونت سیتومگالوویروس رانمی‌توان تنها بر اساس یافته‌های بالینی با اطمینان مطرح کرد، به طوری که حتی از نظر نمای آندوسکوپی می‌تواند کاملاً شبیه کولیت پسودوممبرانو باشد. این مقاله بیماری را با تب و اسهال آبکی معرفی می‌کند که به علت ابتلاء به آرتریت روماتوئید تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی بوده و پیشتر تحت درمان آنتی‌بیوتیکی قرار گرفته است. در کولونوسکوپی انجام گرفته نمای کولیت پسودوممبرانو دیده شد و بیمار تحت درمان با وانکوامایسین و مترونیدازول قرار گرفت ولی بهبود پیدا نکرد. در نهایت آنتی‌بادی علیه سیتومگالوویروس مثبت شد و توسط آنتی‌ژن سیتومگالوویروس، عفونت سیتومگالوویروس برای بیمار تایید شده تحت درمان قرار گرفت.

کلیدواژه: کولیت سیتومگالوویروس، کولیت پسودوممبرانو، والگانسیکلولویر

گوارش / دوره ۱۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۸، ۱۶۴-۱۶۹

کولیت سیتومگالوویروس به صورت تب، بی‌اشتهاای، احساس ضعف و بی‌حالی، کاهش وزن، درد شکم، اسهال آبکی، تهوع و استفراغ و خونریزی گوارشی می‌تواند تظاهر پیدا کند^(۱،۲). درگیری دستگاه گوارش توسط سیتومگالوویروس براساس علایم بالینی، زخم‌ها و خراشیدگی‌های مخاطی*** در نمای آندوسکوپی، شواهد تخریب بافتی و وجود اجسام انکلیزیونی**** ویروسی در پاتولوژی می‌تواند تشخیص داده شود، تشخیص سریع عفونت سیتومگالوویروس با ارزیابی آنتی‌ژن سیتومگالوویروس و شناسایی سیتومگالوویروس در خون یا مایعات دیگر توسط واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR)***** مقدور است.

نمای آندوسکوپیک کولیت سیتومگالوویروس می‌تواند نمای کولیت پسودوممبرانو را کاملاً تقلید کند. در این مقاله نیز یک مورد کولیت

سابقه یا زمینه

درگیری سیستم گوارش توسط سیتومگالوویروس یکی از عوارض جدی و نادر در بیماران مبتلا به بیماری‌های بافت همبند است که تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی قرار دارند. البته درگیری دستگاه گوارش توسط سیتومگالوویروس بیشتر در افرادی که پیوند ارگان‌های مختلف داشته یا مبتلا به عفونت با ویروس نقص سیستم ایمنی (HIV)** هستند، مشاهده می‌شود^(۱). روده بزرگ بعد از شبکیه شایع ترین ارگان درگیر ناشی از سیتومگالوویروس در بیماران مبتلا به ایدز است^(۲). درگیری دستگاه گوارش توسط سیتومگالوویروس می‌تواند موضعی یا منتشر باشد^(۳).

نویسنده مسئول: خیابان ولی عصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه ناصری، پلاک ۱۳۰، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۷۹۳۸۹۶
نامبر: ۰۲۱ - ۸۸۷۹۹۸۴۰

پست الکترونیک: nasere@yahoo.com

تاریخ اصلاح نهایی: ۸۸/۱۲/۴
تاریخ دریافت: ۸۸/۴/۱۴

تاریخ پذیرش: ۸۸/۱۲/۵

* Cytomegalovirus

** Human immunodeficiency virus

*** Mucosal erosions

**** Inclusion Body

***** Polymerase Chain Reaction

کولیت پسودوممبرانوනاشی از سیتوомگالووپروس


جدول ۲: نتایج آزمایش‌های انجام شده برای بیمار روز بعد از دریافت الگانسیکلوبیر (۱۰ روز بعد از بستری)

محدوده طبیعی	واحد	میزان	تست‌های آزمایشگاهی
۴۵۰۰-۱۱۰۰	میلی مترمکعب	۱۳۰۰	WBC
۴-۵/۲	میلی مترمکعب / $\times 10^6$	۴/۱۰	RBC
۱۱-۱۶	دسمی لیتر / گرم	۱۷/۴	Hb
۳۶-۴۶	درصد	۳۷/۴	Hct
۷۸-۱۰۲	fL	۹۳/۳	MCV
۲۶-۳۴	Pg	۳۰/۹	MCH
۳۱-۳۷	دسمی لیتر / گرم	۳۳/۲	MCHC
۱۱/۵-۱۴/۵	درصد	۱۳/۴	RDW
۱۵.....-۴۵.....	میلی مترمکعب	۳۹.....	Platelets
۲۵ متراز	ساعت / میلی لیتر	۳۷	ESR 1 st hr
برای سن بالای ۵۵ سال			
۱۷-۴۳	دسمی لیتر / میلی گرم	۳۲	اوره
۰/۵-۱/۵	دسمی لیتر / میلی گرم	۰/۸	کراتینین
۱۳۶-۱۴۵	لیتر / میلی اکی والان	۱۴۲	سدیم
۲/۵-۵	لیتر / میلی اکی والان	۴/۳	پتاسیم

جدول ۳: نتیجه آزمایش مدفوع

نتیجه	تست
شد	قوم
قهوهای	رنگ
۶-۸	گلبول سفید
۲-۳	گلبول قرمز
دیده نشد	قارچ
دیده نشد	انکل یا تخم انگل
دیده نشد	کیست پر و توزوا

آزمایش‌های رایت (Wright) و ویدال (Widal) نیز منفی گزارش شد. بیمار تحت آندوسکوپی فوکانی قرار گرفت که طی آن ازو فازیت مونیلیایی (monillia esophagitis) گراش شد (شکل ۱).



شکل ۱: نمای ازو فازیت مونیلیایی در آندوسکوپی فوکانی

و هم چنین برای بیمار کولونوسکوپی و نمونه برداری نیز انجام شد که در کولونوسکوپی نمای کولیت پسودوممبرانوی شدید (Severe Pseudomembranous Colitis) داشت که توسط پاتولوژیست نیز تایید شد (شکل ۲).


سیتوومگالوپروس که به صورت نمای آندوسکوپیک کولیت پسودوممبرانو ظاهر پیدا کرده است، گزارش می‌شود.

شرح مورد

بیمار خانم ۶۲ ساله‌ای است که با شکایت تب و لرز و اسهال آبکی (۲۰ بار در روز) از ۵ روز قبل مراجعه کرده است. بیمار مورد شناخته شده آرتربیت روماتوئید از حدود ۴ سال قبل است که تحت درمان با متوتروکسات ۱۰ میلی گرم در هفت‌هه بوده و حدود چند ماه قبل آزاتیوپرین ۵۰ میلی گرم در روز به رژیم درمانی بیمار اضافه شده است. هم چنین بیمار ۴ ماه قبل درمان ۴ دارویی هلیکوباکترپیلوری را با مترونیدازول، کلاریترومایسین و رانیتیدین قرار دریافت کرده است. بیمار درد شکم مختصراً را ذکرمی کرد که ربطی به غذا خوردن نداشت ولی شکایتی از استفراغ و دفع خون در مدفع عرض نداشت. علاجیم حیاتی بیمار در هنگام ورود عبارت بودند از: درجه حرارت: ۳۷/۸ درجه سانتی گراد، تعداد تنفس ۲۰ بار در دقیقه، تعداد ضربان قلب ۹۰ بار در دقیقه و فشار خون ۱۱۰/۶۰ میلی متر جیو (بدون تغییرات وضعیتی فشار خون). در معاینه بیماری حال (ill) بوده ولی توکسیک نبود. در معاینه سرو گرد، ملتجمه مختصراً رنگ پر بیده بود، ولی اسکلرایکتریک نبود. در معاینه قفسه سینه نکته مشکوک یا پاتولوژیکی مشاهده نشد. در سمع قلب، سوفل یا صدای اضافی سمع نشد. سمع ریه هابنیز پاک بود و رال، کراکل یا صدای اضافی وجود نداشت. شکم تا اندازه ای نرم بوده، اورگانومگالی وجود نداشت. فقط تندرنس مختصراً در کل شکم وجود داشت ولی ریباندوگاردینگ واضح وجود نداشت. نتایج تست‌های آزمایشگاهی انجام شده برای بیمار در جداول ۱ و ۲ خلاصه شده است.

جدول ۱: نتایج آزمایش‌های انجام شده برای بیمار در موقع ورود به بیمارستان

محدوده طبیعی	واحد	میزان	تست‌های آزمایشگاهی
۴۵۰۰-۱۱۰۰	میلی مترمکعب	۱۵۰۰	WBC
۴-۵/۲	میلی مترمکعب / $\times 10^6$	۳/۶۹	RBC
۱۲-۱۶	دسمی لیتر / گرم	۱۱/۸	Hb
۳۶-۴۶	درصد	۳۵/۲	Hct
۷۸-۱۰۲	fL	۹۳	MCV
۲۶-۳۴	Pg	۳۲	MCH
۳۱-۳۷	دسمی لیتر / گرم	۳۴/۴	MCHC
۱۱/۵-۱۴/۵	درصد	۱۲/۵	RDW
۱۵.....-۴۵.....	میلی مترمکعب	۲۰۵۰۰	Platelets
۲۵ متراز	ساعت / میلی لیتر	۵۵	ESR 1 st hr
برای سن بالای ۵۵ سال			
۷۵-۱۱۵	دسمی لیتر / میلی گرم	۸۶	قد خون ناشتا
۱۷-۴۳	دسمی لیتر / میلی گرم	۲۸	اوره
۱۳۶-۱۴۵	لیتر / میلی اکی والان	۱۳۴	سدیم
۳/۵-۵	لیتر / میلی اکی والان	۴	پتاسیم
۰/۳-۱	دسمی لیتر / میلی گرم	۰/۸	تام
۰/۱-۰/۳	دسمی لیتر / میلی گرم	۰/۲	مستقیم
<۳۵	لیتر / واحد	۱۴	(AST) SGOT
<۳۵	لیتر / واحد	۳۰	(ALT) SGPT
۶۴-۳۰۶	لیتر / واحد	۲۵۶	آلکالن فسفاتاز



شکل ۲: نمای کولیت پسودوممبرانوی شدید در گولون عرضی

ضعیف هستند، مثلاً متعاقب پیوند اعضاء، بدخیمی‌ها، نقص ایمنی مادرزادی یا اکتسابی، درمان با استروئید یا کمoterپای رادرگیرمی کند ولی موارد محدودی از کولیت سیتومگالوویروس در افرادی که از نظر سیستم ایمنی سالم هستند، گزارش شده است (۱۲-۱۶). عفونت حاد سیتومگالوویروس در افراد با سیستم ایمنی سالم معمولاً بدون علامت بوده ویروس به صورت نهفته در بدن باقی می‌ماند و خطر فعال شدن در تمام طول زندگی وجود دارد (۱۳).

کولیت سیتومگالوویروس در افراد با سیستم ایمنی ضعیف تقریباً همیشه ثانویه به علت فعال شدن عفونت نهفته اتفاق می‌افتد ولی در افراد بدون ضعف ایمنی معمولاً باسته به علت عفونت اولیه است (۷).

در بیماران با سیستم ایمنی سالم گولون سیگموئید درگیری بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد در حالی که در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی، درگیری سکوم شایع تر است. از لحاظ کلینیکی کولیت سیتومگالوویروس با ترباد اسهال، تب و درد شکمی تظاهر پیدامی کند (۹). در حالی که طبق مقالات مرور شده (۶-۱۲)، کولیت سیتومگالوویروس در افراد با سیستم ایمنی سالم در ۸۲٪ موارد با اسهال خودش را نشان می‌دهد که می‌تواند خونی (۳٪) یا آبکی (۲۹٪) باشد. تب در ۷۶٪ و درد شکم در ناحیه رکتوم در ۵۳٪ این بیماران گزارش شده است (۱۰). علایم دیگر این بیماران احساس زورپیچ (tenesmus)، ضعف و بی‌حالی، بی‌اشتهاای و کاهش وزن است. اگرچه برخی از بیماران (با سیستم ایمنی سالم) خودبجود بهبود پیدا می‌کنند ولی اکثر بیماران بدون درمان دچار عوارض شدیدی مانند سوراخ شدن روده، خونریزی از دستگاه گوارش و مگاکولون توکسیک می‌شوند.

علایم و نشانه‌های کولیت سیتومگالوویروس می‌تواند کولیت ایسکمیک، کولیت پسودوممبرانوو کولیت همراه با سایر پاتولوژی‌ها را تقلید کند. بنابراین در هر بیماری که اسهال آبکی یا خونی، تب، درد شکم و کشت مدفوع منفی دارد باید به کولیت سیتومگالوویروس به عنوان یکی از تشخیص افتراقی های مهم فکر کنیم (۱۴). در مقاله‌مانیز بیمار با اسهال آبکی مراجعت کرده بود و با توجه به مصرف آنتی بیوتیک در چند ماه قبل از مراجعه و نمای کولونوسکوپی و گزارش پاتولوژی با شک قوی به کولیت پسودوممبرانو تحت درمان قرار گرفت. در بیماران مبتلا به ایدز، زخم‌های بزرگ منتشر شایع ترین یافته آندوسکوپیک در مبتلایان به سیتومگالوویروس به شمار می‌آید (۱۵-۱۶). در واقع یافته‌های آندوسکوپیک رامی توان به صورت زیر طبقه بندی کرد: کولیت همراه با اولسر (۳۹٪)، اولسر تنها (۲۸٪) و کولیت تنها (۲۰٪). اندازه اولسرها از ۳/۰ تا ۱۰ سانتی متر متفاوت است.

در توصیف مشخصات کولیت سیتومگالوویروس خونریزی زیر اپی تلیال بارزترین یافته در نظر گرفته شد ولی ویلکوکس ^{*} و همکاران بیماری را گزارش کردنده که نمای مخاطی نرمال داشت و در بیوپسی تشخیص کولیت

* Wilcox

گزارش پاتولوژی به صورت زیربود:

ادم و التهاب در لامینا پروپریا همراه با انفیلتراسیون سلول‌های التهابی مزمن که تشخیص کولیت پسودوممبرانوی پیشنهاد می‌شود.

برای بیمارسونوگرافی شکم و لگن نیز انجام شد که البته نکته پاتولوژیکی گزارش نشد. در عکس قفسه سینه (CXR) نیز مورد مشکوک مشاهده نشد. در ضمن سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق نیز انجام شد که طی آن افزایش ضخامت دیواره گولون نزولی همراه با ادم و آسیت دیده شد.

این یافته‌ها در نهایت به نفع کولیت پسودوممبرانوگزارش شد. بنابراین برای بیمار درمان کلستریدیوم دیفسیل (C.Difficile) با مترونیدازول وریدی، وانکومایسین خوارکی و درمان مونیلیازیس با قطره نیستاتین و فلوکونازول شروع شد.

ولی برخلاف درمان حال عمومی بیمار فرقی نکرده، اسهال بیمار قطع نشد. جواب نمونه مدفوع نیز از نظر توکسین کلستریدیوم دیفسیل منفی گزارش شد. بنابرین با شک به کولیت سیتومگالوویروس برای بیمار آنتی بادی (IgG) CMV چک شد که (IgG) CMV Ab (IgM) CMV چک شد که (IgG) CMV Ab (IgM) CMV شد. (۲۶۷ IU/mL).

برای بیمار در این مرحله نمونه خون از نظر آنتی زن سیتومگالوویروس فرستاده شد که مثبت گزارش شد. بر طبق اطلاعات فوق درمان با والگانسیکلوفیر (Valganciclovir) خوارکی برای بیمار شروع شد.

۴ روز بعد از شروع والگانسیکلوفیر علایم بیمار به طور کامل از بین رفت.

بحث

سیتومگالوویروس یکی از اعضای گروه بتا هرپس‌ویروس‌ها است و دارای یک DNA دور شته‌ای، ۴ رشته RNA یک لیبید پروتئینی و یک پوشش لیپوپروتئین است. همانند سازی ویروس با تولید انکلوزیون داخل هسته‌ای بزرگ و انکلوزیونهای سیتوبلاسمی کوچکتر همراه است. از نظر پاتولوژی، سلولهای سیتومگالیک داخل بدن (که احتمالاً سلول‌های اپی تلیال آلوده هستند) از سلولهای مجاور خود ۲ تا ۴ برابر بزرگ‌ترند و اغلب حاوی یک انکلوزیون هسته‌ای ۸-۱۰ میکرومتری واقع در محیط هسته اند که توسط یک هاله واضح که نمای چشم جغد ایجاد می‌کنند، احاطه شده اند (۲).

عفونت جدی با سیتومگالوویروس معمولاً افرادی که از نظر سیستم ایمنی

اگرچه این دروش تصویربرداری حساسیت بالائی دارند ولی یافته های آنها برای تشخیص کولیت سیتوومگالوویروس غیراختصاصی بوده و می توانند در سایر موارد کولیت نیز مثبت شوند (۲۵-۲۶) در بیماران مانیزدم و افزایش ضخامت مخاطی در کولون نزوی وجود داشت. برای درمان عفونت سیتوومگالوویروس از گانسیکلولوپیر، والگانسیکلولوپیر، فوسکارنت و سیدوفووپیر (Cidofovir) می توان استفاده کرد. گانسیکلولوپیرک مشتق گوانوزینی است که به عنوان مهارکننده انتخابی DNA پلیمراز سیتوومگالوویروس عمل می کند. والگانسیکلولوپیر پیش داروی خوراکی است که به سرعت در بافت های روده و کبد به گانسیکلولوپیر متابولیزه می شود. تقریباً ۶۰٪ دوز خوراکی والگانسیکلولوپیر جذب می شود. سطح خونی گانسیکلولوپیر که به دنبال تجویز دوز ۹۰۰ میلی گرم والگانسیکلولوپیر خوراکی ایجاد می شود، مشابه تجویز گانسیکلولوپیر و ریدی با دوز ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. فوسکارنت نیز به وسیله مهار DNA پلیمراز ویروسی علیه عفونت سیتوومگالوویروس عمل می کند. از آنجایی که این دارو برای فعالیت نیازی به فسفوریل اسیتون ندارد، علیه نمونه های سیتوومگالوویروس مقاوم به گانسیکلولوپیر نیز موثر است. سیدوفووپیرک آنالوگ نوکلئوزیدی با نیمه عمر داخل سلولی طولانی است که این نیمه عمر طولانی تجویز متابوپ دارو را به صورت وریدی امکان پذیرمی سازد (۳).

نتیجه گیری

این مقاله، نشان می دهد که نمای پسودوممبرانومخصوصاً در افراد با سیستم ایمنی ضعیف شده پاتوگنومونیک کلستریدیوم دیفسیل نیست و باید پاتوژن هایی که در بالا اشاره شدند کنار گذاشته شوند. اگرچه نمای پسودوممبران در عفونت با سیتوومگالوویروس ناشایع است ولی نشان داده شد که باید به این موضوع دقت کرد و از آنجایی که تشخیص سریع عفونت سیتوومگالوویروس مهم است توصیه می شود که در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند، آنتی ژن سیتوومگالوویروس به روش PCR و آنتی بادی IgM علیه CMV (IgM anti-CMV) باید بررسی شود تا عفونت سیتوومگالوویروس تشخیص داده شده، از عوارض جدی این عفونت جلوگیری شود.

* Plesiomonas Shigelloides

** Polymerase Chain Reaction

REFERENCES

- Nobuhiro T, Sotaro S, Yoshifumi K, Toshiyuki S, Masaya M, Seiei M, et al: Gastrointestinal Cytomegalovirus Infection in Collagen Diseases. *Tokai J Exp Clin Med* 2003; 1: 35-8.
- Buckner FS, Pomeroy C. Cytomegalovirus disease of the gastrointestinal tract in patients without AIDS. *Clin Infect Dis* 1993; 17: 644-56.
- Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, et al. Harrison's PRINCI

پیام رسانی آندوسکوپیک واضح کولیت پسودوممبرانورا داشت و ارزیابی سیتو توکسین کلستریدیوم دیفسیل که حساسیت ۹۴-۱۰۰٪ دارد، منفی گزارش شد. اگر مروری به مقالات در سال های گذشته بکنیم، تنها ۵ مورد گزارش شده است که عفونت با سیتوومگالوویروس موجب کولیت پسودوممبران شود (۱۵-۱۹).

اگرچه نمای پسودوممبرانو، پاتوگنومونیک کلستریدیوم دیفسیل در نظر گرفته می شود ولی می تواند با عفونت سایر پاتوژن ها مانند شیگلا (۲۰)، ای کولای (Ecoli 0157:H7) (۲۱)، پلیسیوموناس شیگلوبیتس* (۲۲)، ایسکمی (۲۴) و مصرف داروهایی مانند طلا (gold) (۲۳) و دیکلوفناک (۲۴) همراه شود. روش های مختلفی برای تشخیص کولیت سیتوومگالوویروس وجود دارد که شامل آنالیز سرو لوزیک، کشت و پرورس، تعیین آنتی ژن توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)** روش های تصویربرداری و بررسی پاتولوژیک نمونه های بافتی گرفته شده توسط آندوسکوپ است. روش استاندارد تشخیص تعیین اجسام انکلیزیونی سیتوومگالوویروس در بافت های درگیری است (۱۴) ولی همان طوری که قبل اگفته شد شناسایی آنتی ژن های سیتوومگالوویروس (PP65) در لکوسیت های خون محیطی یا سیتوومگالوویروس DNA در خون یا بافت ها ممکن است تشخیص بیماری سیتوومگالوویروس را تسريع کند. ردپای CMV DNA توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) حساس ترین روش تشخیصی سیتوومگالوویروس در خون و سایر مطالعات بدن است (۳).

البته لازم به ذکر است که به علت شیوع بالای آنتی بادی پخت علیه CMV IgG anti-CMV) بالا بودن IgG برای کولیت سیتوومگالوویروس تشخیصی نیست. وجود آنتی بادی IgM علیه CMV-IgM anti-CMV باعفونت اخیر سیتوومگالوویروس مطابقت دارد ولی تشخیص بیماری باعفونت را ثابت نمی کند. علاوه بر این در بیش از ۱۰٪ بیماران باعفونت فعال سیتوومگالوویروس جواب آزمایش IgM منفی است (۱۴). در بیمار ما نیز آنتی بادی IgG با تیتر بالای مثبت گزارش شد ولی آنتی بادی IgM منفی گزارش شده بود و مثبت گزارش شدن آنتی ژن سیتوومگالوویروس تشخیص سیتوومگالوویروس مفید هستند، یافته های کلاسیک عبارتند از افزایش ضخامت دیواره روده، تنگی های لومن روده، زخم و نامنظمی مخاطی.

PLES OF INTERNAL MEDICINE 17 ed. United States of America. McGraw-Hill Companies; Chapter 175; 2008: 1109-13.

- AU - Dieterich DT; Rahmin M SO - J. Cytomegalovirus colitis in AIDS: presentation in 44 patients and a review of the literature. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1991;4 Suppl 1: 529-35.
- Orenstein JM, Dieterich DT. The histopathology of 103

- consecutive colonoscopy biopsies from 82 symptomatic patients with acquired immunodeficiency syndrome: original and look-back diagnoses. *Arch Pathol Lab Med* 2001; 125: 1042-6.
6. Hamlin PJ, Shah MN, Scott N, Wyatt JI, Howdle PD. Systemic cytomegalovirus infection complicating ulcerative colitis: a case report and review of the literature. *Portgrad Med J* 2004; 80:233-5.
 7. Klauber E, Briski LE, Khatib R. Cytomegalovirus colitis in the immunocompetent host: an overview. *Scand J Infect Dis* 1998; 30: 559-64.
 8. Galiatsatos P, Schrier I, Lamoureux E, Szilagyi A. Meta-analysis of outcome of cytomegalovirus colitis in immunocompetent hosts. *Dig Dis Sci* 2005; 50: 609-16.
 9. Siegal DS, Hamid N, Cunha BA. Cytomegalovirus colitis mimicking ischemic colitis in an immunocompetent host. *Heart Lung* 2005; 34: 291-4.
 10. Karakozis S, Gongora E, Caceres M, Brun E, Cook JW. Life-threatening cytomegalovirus colitis in the immunocompetent patient: report of a case and review of the literature. *Dis Colon Rectum* 2001; 44: 1716-20.
 11. Lee CS, Low AH, Ender PT, Bodenheimer HC Jr. Cytomegalovirus colitis in an immunocompetent patient with amebiasis: case report and review of the literature. *Mt Sinai J Med* 2004; 71: 347-50.
 12. Ng FH, Chau TN, Cheung TC, King C, Wong SY, Ng WF, et al. Cytomegalovirus colitis in individuals without apparent cause of immunodeficiency. *Dig Dis Sci* 1999; 44: 945-52.
 13. Goodgame RW. Gastrointestinal cytomegalovirus disease. *Ann Intern Med* 1993; 119: 924-35.
 14. Mong-Wei L, Jin-Tung L, King-Jen C, Po-Huang L, Been-Ren L.; Cytomegalovirus Colitis in an Immunocompetent Patient: Report of a Case and Review of the Literature. *J Soc Colon Rectal Surgeon (Taiwan)* March 2008.
 15. Rene E, Marche C, Chevalier T, Rouzioux C, Regnier B, Saumont AG, et al. Cytomegalovirus colitis in acquired immunodeficiency syndrome. *Dig Dis Sci* 1988; 33: 741-50.
 16. Wilcox M, Chalasani N, Lazenby A, Schwartz D. Cytomegalovirus colitis in acquired immunodeficiency syndrome: a clinical and endoscopic study. *Gastrointest Endosc* 1998; 48: 39-43.
 17. Beaugeria L, Ngo Y, Goujard F, Gharakhanian S, Carbonnel F, Luboinski J, et al. Etiology and management of toxic megacolon in patients with HIV infection. *Gastroenterology* 1994; 107: 858-63.
 18. Franco J, Massey BT, Komorowski R. Cytomegalovirus infection causing pseudomembranous colitis. *Am J Gastroenterol* 1994; 89: 2246-7.
 19. Erdozain JC, Lizasoain J, Martin-de-Argila C, Presa M, Munoz F. Cytomegalovirus colitis in a patient carrying the human immunodeficiency virus: The endoscopic image similar to pseudomembranous colitis. *Rev Esp Enferm Dig* 1995; 87: 247-9.
 20. Kelber M, Ament ME. Shigella disenteriae: a forgotten cause of pseudomembranous colitis. *J Pediatr* 1976; 89: 595-6.
 21. Hunt CM, Harvey JA, Youngs ER, Irwin ST, Reid TM. Clinical and pathologic variability of infection by enterohaemorrhagic (Vero cytotoxin producing) Escherichia coli. *J Clin Pathol* 1989; 42: 847-52.
 22. Van Loon FP, Rahim Z, Chowdhury KA, Kay BA, Rahman SA. Case report of *Plesiomonas shigelloides*-associated persistent dysentery and pseudomembranous colitis. *J Clin Microbiol* 1989; 27: 1913-5.
 23. Reinhart WH, Kappeler M, Halter F. Severe pseudomembranous and ulcerative colitis during gold therapy. *Endoscopy* 1983; 15: 70-2.
 24. Gentic A, Pennee YL. Diclofenac-induced pseudomembranous colitis. *Lancet* 1992; 340: 126-7.
 25. Teixidor HS, Honig CL, Norsoph E, Albert S, Mouradian JA, Whalen JP. Cytomegalovirus infection of the alimentary canal: radiologic findings with pathologic correlation. *Radiology* 1987; 163: 317-23.
 26. Cho SR, Tisnado J, Liu CI, Beachley MC, Shaw CI, Kipreos BE, Schneider V. Bleeding cytomegalovirus ulcers of the colon: barium enema and angiography. *AJR AM J Roentgenol* 1981; 11: 241-6.

Cytomegalovirus Colitis with Similar Endoscopic Pattern of Pseudomembranous Colitis in Collagen Vascular Disease

Pashaei M¹, Ebrahimi-Daryani N², Ajdarkosh H³, Ameli M³

¹ Resident of Internal Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Professor, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ABSTRACT

Cytomegalovirus (CMV) infection can cause colitis which is usually manifested with fever, weight loss, anorexia and abdominal pain. Watery diarrhea can be the only manifestation. CMV colitis usually can not be diagnosed according to the clinical findings. Moreover, endoscopic appearance can exactly mimic pseudo-membranous colitis. Here by, we are presenting a patient with fever and watery diarrhea receiving immunosuppressive treatment due to rheumatoid arthritis who had received antibiotics. Pseudo-membranous colitis was revealed during colonoscopy and subsequently metronidazole and vancomycine treatment initiated but no improvement was observed. Finally, according to the positive CMV antibody and the presence of CMV antigen diagnosis was confirmed and valganciclovir for CMV colitis was administered.

Keywords: Cytomegalovirus colitis ,Pseudo-membranous colitis, Valganciclovir

Govaresh/ Vol. 14, No.3, Autumn 2009; 164-169

Corresponding author:

Second floor of Jam-E-Jam, No. 130, Next to Zafar

Cross, Vali-E-Asr Ave, Tehran, Iran

Tel: +98 21 88799446 Fax: +98 21 88799840

Email: nasere@yahoo.com

Received: 5 Jul. 2009 **Edited:** 23 Feb. 2010

Accepted: 23 Feb. 2010