

## بررسی شیوع عفونتهای ویروسی در اهداکنندگان خون در استان قزوین در دوره‌های زمانی مختلف و زمان وقوع زلزله به

دکتر سید حسن بزرگی<sup>۱</sup>، دکتر مسعود احمدزاد اصل<sup>۲</sup>، دکتر هما رمضانی<sup>۱</sup>، حسین کارگفرد<sup>۱</sup>، دکتر سید مؤید علویان<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> پژوهشگر، مرکز تحقیقات سلامت انتقال خون ایران و پایگاه انتقال خون قزوین

<sup>۲</sup> پژوهشگر، مؤسسه سلامت پژوهان نیکان، مرکز هپاتیت تهران

<sup>۳</sup> استاد، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مرکز هپاتیت تهران

### چکیده

#### زمینه و هدف

سلامت خونهای اهداده و سلامت خون و فرآوردهای خونی انتقال یافته به بیماران از مهمترین دغدغه‌های سیستم انتقال خون است. پس از همه‌گیری‌های جهانی ویروس‌های HIV، HBV و HCV، غربالگری در مراحل مختلف انتقال خون اهمیت بیشتری پیدا کرد. همچنین سلامت خونهای دریافتی در زمان بروز بحران، با توجه به تغییر الگوی اهداکنندگان نیز یکی از سوالات مطرح شده در این زمینه است. در این مطالعه قصد داریم تا سیر تغییرات آلدگی ویروسی در خونهای اهدایی در استان قزوین- ایران را در سه سال متولی و در زمان زلزله به بررسی کنیم.

#### روش بررسی

این مطالعه با استفاده از سیستم ثبت اطلاعات اهداکنندگان استان قزوین در سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۶ بر روی ۴۸۱۶ اهداکننده خون صورت گرفت و اطلاعات مربوط به مشخصات اهداکنندگان و نتایج بررسی مارکرهای ویروسی HBV و HCV در آنها بررسی و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS آنالیز شد. دوره زمانی ۱۱ روزه پس از زلزله به در سال ۱۳۸۲ به عنوان دوره پس از بحران با دوره مشابه سال قبل مورد مقایسه قرار گرفت.

#### یافته‌ها

میزان شیوع آلدگی‌های آنتی‌زن سطحی هپاتیت B و HCV در افراد مورد مطالعه به ترتیب ۰/۱۵ و ۰/۰۵ درصد بوده است و میزان آلدگی بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل تفاوت آماری معنی داری نداشت. ۴۵/۳ درصد از افراد، اهداکنندگان مستمر و دارای میزان آلدگی کمتری نسبت به سایرین بودند ( $p < 0/05$ ). میزان آلدگی هپاتیت B در سه سال متولی سیر معنی دار نزولی داشت؛ در حالی که این کاهش در مورد HCV مشاهده نشد. با وجود افزایش ۳/۶ برابری مقدار خونهای اهدایی در زمان زلزله به، میزان آلدگی آنها در این دوره زمانی با سایر روزهای همان سال و همچنین دوره زمانی مشابه در سال قبل تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد.

#### نتیجه‌گیری

کاهش شیوع آنتی‌زن سطحی هپاتیت B می‌تواند به خاطر راه اندازی و کارایی سیستم جامع ثبت اطلاعات اهداکنندگان در سال دوم مطالعه باشد. با وجود عدم افزایش آلدگی در زمان بحران باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ساماندهی و افزایش سلامت خونهای اهدایی در زمان بحران انجام گیرد.

**کلید واژه:** اهدای خون، سلامت خون، سیستم ثبت اطلاعات، بحران، تغییرات سالیانه

گوارش / دوره ۱۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۵، ۲۴۸-۲۴۲

تاریخ پذیرش: ۱۴/۱۱/۸۵

تاریخ اصلاح نهایی: ۱۴/۱۱/۸۵

تاریخ دریافت: ۱۸/۳/۸۵

انتقال خون هستند و با افزایش روزافزون شیوع این بیماریها، احتمال انتقال بیماریها به خصوص ویروس‌های هپاتیت و HIV، عفونی از اهداکنندگان خون به دریافت‌کنندگان فرآورده‌های خونی افزایش یافته است.<sup>(۱-۱۳)</sup> راهبردهای مختلفی برای کاهش این خطر وجود دارند که عبارتند از: برنامه‌های آموزش همگانی، تکمیل پرسشنامه‌های اختصاصی در مورد عوامل خطرزا (مخصوصاً در مورد ابتلا به HIV و هپاتیت‌های ویروسی) قبل از اهدای خون و قرار دادن گزینه محروم‌نامه توصیه به عدم استفاده از خون در اختیار اهداکننده. در مورد آخر، اهداکننده به صورت کاملاً محروم‌نامه‌ای اعلام می‌دارد که خون

#### زمینه و هدف

هدف اصلی سیستم انتقال خون در تمامی کشورها انتقال خون و فرآورده‌های خونی سالم به افراد نیازمند به آنها است؛ چون این امر نقش مهمی را در تأمین و نگهداری سلامت بسیاری از بیماران ایفا می‌کند. بیماریهای منتقل شونده از راه خون یکی از دغدغه‌های اصلی نویسنده مسئول: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه الله (عج)، دانشکده پزشکی تلفن: ۰۲۰۵۵۷۵۲

E-mail: editor@hepmone.ir

ایفا کند؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد راه اندازی این سیستم باعث کاهش موارد خونهای اهدایی آلوده شده باشد. در این مطالعه میزان شیوع ویروسهای هپاتیت B و C در اهداکنندگان خون استان قزوین در سال ۱۳۸۱ (قبل از راه اندازی بانک اطلاعات جامع) و سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ماهه اول سال ۱۳۸۳ (پس از راه اندازی بانک اطلاعات جامع) مورد بررسی قرار گرفته است.

### روش بررسی

این مطالعه به صورت مطالعه پیمایشی<sup>\*</sup> با سرشماری از کلیه اهداکنندگان خون استان قزوین در دوره زمانی ابتدای فروردین ۱۳۸۱ تا اول آذر ۱۳۸۳ انجام شد. کلیه داده‌های مربوط به اهداکنندگان خون در سال ۱۳۸۱ بر اساس پرسشنامه‌های کاغذی تکمیل شده آنها در زمان اهدا خون و نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی آنها پس از راه اندازی بانک اطلاعات اهدای خون در سال ۱۳۸۲ به صورت گذشته‌نگاری این بانک اطلاعاتی شد و در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ماهه اول سال ۱۳۸۳ نیز برای کلیه افراد مراجعه‌کننده برای اهدای خون، اطلاعات مذکور همزمان در این بانک اطلاعاتی وارد شدند و واحدهای پذیرش، مصاحبه و معاینه، گرفتن خون و آزمایشگاه بر اساس کد کیسه خون اخذ شده اطلاعات فرد را در فرمهای مربوط وارد کردند.

اطلاعات مربوط به سن، جنس، تعداد دفعات اهدای خون، وضعیت پذیرش و یا عدم پذیرش اهداکننده، وضعیت تأهل و نتایج آزمایش‌های اندازه‌گیری آنتی‌زن سطحی هپاتیت B (HBs Ag) و آنتی‌بادی برعلیه هپاتیت C (HCV Ab) ثبت شدند. HBsAg با استفاده از کیت‌های تجاری موجود microelisa system، Organon Teknika، Holland<sup>★</sup> (Elisa) به روش الایزا 2 HBsAg uni\_form<sup>★</sup> (Hepanostika) به روش الایزا (Hepanostika) اندازه‌گیری شد. برای بررسی عفونت هپاتیت C با استفاده از کیت الایزا نسل سوم (ETI HCV K-3، DiaSorin, Spain) و آنتی‌بادی برعلیه HCV Ab<sup>★</sup> (RIBA-3 Chiron, New Jersey, USA) مورد ارزیابی قرار گرفتند و تأیید شدند.

در این مطالعه اطلاعات مربوط به اهداکنندگان در دوره زمانی بین وقوع زلزله تأسف بار بم تا زمان اعلام کفایت خونهای دریافتی از مردم توسط سازمان انتقال خون (۱۴-۶ دی ۱۳۸۲) با دوره زمانی مشابه در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و نیز با سایر روزهای سال ۱۳۸۲ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

داده‌های به دست آمده از کلیه اهداکنندگان پس از استخراج از بانک اطلاعاتی مربوط، توسط نرم‌افزار آماری SPSS 11.5 مورد تجزیه و

اهداشده نباید مورد استفاده قرار گیرد. شواهد موجود حاکی از این است که این راهبردها در حذف خونهای پرخطر و آلوده مفید بوده‌اند.<sup>(۵-۹، ۱۱-۱۶)</sup> با وجود اقدامات انجام‌شده و کاهش قابل توجه میزان خونهای اهدایی آلوده و نیز استفاده از سیستمهای کنترل کیفی پیشرفته و دقیق برای کشف و انهدام این خونها، همچنان میزان کمی از خونهای اهدایی به انواع عوامل عفونی آلوده هستند و با وجود خطر پایین انتقال عفونت از خونهای اهداشده، فشار زیادی از طرف مردم وجود دارد تا همه آزمایش‌های لازم برای کاهش عفونتهای منتقل‌شونده از راه انتقال خون به کار گرفته شود.<sup>(۱۷-۱۸)</sup> در ایران مشابه بسیاری از کشورهای دارای سیستم انتقال خون استاندارد، آزمایش‌های سرولوژیک برای کلیه خونهایی که از اهداکنندگان گرفته شده است، انجام می‌شود.

یکی از مسائل و سوالاتی که در زمینه انتقال خون وجود دارد تأمین خون سالم در زمانهای بروز بحران و حوادث طبیعی است و با توجه به اینکه کشور ما یکی از نقاط پرحداده در این زمینه است، کسب اطلاعات مستند در مورد شرایط سلامت خون در زمانهای بروز بحران به دنبال مراجعة وسیع مردم جهت اهدای خون ضروری به نظر می‌رسد. یکی از بزرگترین حوادث طبیعی ایران در سالهای گذشته، زلزله ۷/۲ ریشتری به مرد ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بود که پس از انتشار خبر زلزله در کشور مردم زیادی برای تأمین نیازهای مصدومین حادثه جهت اهدای خون مراجعه کردند که پس از مدت ۱۰ روز سازمان انتقال خون در اطلاعیه‌های عمومی کفایت خونهای دریافتی را اعلام کرد. در مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر در مورد اهدای خون به دنبال بحرانهای بزرگ تردیدهایی در مورد سلامت و کفایت خونهای دریافتی به دنبال بحران ابراز شده و بیان شده است که سلامت خونهای دریافتی پس از بروز بحران سؤال برانگیز و مقدار آن نیز بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز است؛ بنابراین توصیه شده است تا از تحریک مردم و تبلیغات در جهت اهدای خون پس از بحران اجتناب شود و به جای آن در موارد اضطراری ذخیره خونی مناسبی در شهر بحران‌زده و شهرهای اطراف آن برای تأمین نیازها، برای مدت حداقل ۳ روز موجود باشد.<sup>(۲۶-۲۹)</sup> پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیویورک حدود ۱ میلیون نفر جهت اهدای خون مراجعه کردند که حدود ۵۰۰,۰۰۰ واحد خون از آنها گرفته شد ولی در نهایت تنها ۲۵۸ واحد خون مورد استفاده قرار گرفت.<sup>(۲۱)</sup>

در سالهای اخیر راه اندازی سیستم الکترونیک ثبت اطلاعات اهداکنندگان و تشکیل بانکهای اطلاعاتی از مشخصات اهداکنندگان در بعضی از پایگاههای انتقال خون در ایران باعث شده است تا علاوه بر شناسایی اهداکنندگان پرخطر که مراجعتهای مکرر جهت اهدا خون در مراکز مختلف دارند، اطلاع رسانی و پیگیری موارد اهداشده آلوده نیز به آسانی صورت گیرد و در غربالگری بیماریهای عفونی مذکور نقش مهمی

<sup>\*</sup> Sequential

<sup>★</sup> Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay

<sup>★★</sup> Recombinant ImmunoBlot Assay

۷/۹٪ اهداکنندگان، دارای سابقه اهدای خون در گذشته بودند. در بررسیها و معایینات اولیه هنگام مراجعته برای اهدای خون، ۶/۹۳٪ مراجعین سالم تشخیص داده شده بودند و برای ۸/۵٪ وضعیت سلامت ناسالم گزارش شده بود. در ضمن ۵/۰٪ افراد نیز یا انصاف داده و یا به صورت موقت معاف از اهدای خون تشخیص داده شده بودند.

برای کلیه خونهای اهدایی، آزمایش‌های ویروس‌شناسی به عمل آمد. در نهایت مشخص شد که ۲۱۸ نمونه (۴۵٪) از نظر HBV و ۷۳ نمونه (۱۵٪) از نظر HCV مثبت بودند. به طور کلی ۲۸۲ نمونه (۵۸٪) دارای حداقل یکی از انواع آلودگیهای ذکر شده بودند. در نمونه‌های خون اهدایی، آلودگی همزمان HBV-HCV در ۹ مورد (۱۹٪ افراد) وجود داشت و هیچ مورد آلودگی همزمان دیگری مشاهده نشد.

میزان فراوانی آلودگیهای یافتشده در مورد هر یک از سه عامل مورد بررسی در زنان و مردان تفاوت آماری معنی‌داری را با هم نشان ندادند. افراد مجرد و متاهل نیز از نظر مثبت بودن عوامل مربوط به HCV تفاوت آماری معنی‌داری با هم نداشتند؛ در حالی که میزان Ab مثبت بودن HBsAg در اهداکنندگان متأهل با اختلاف آماری معنی‌داری بیش از افراد مجرد بوده است (به ترتیب ۵۱٪ و ۳۶٪،  $p=0.002$ ). (جدول ۱).

★ اهداکننده‌ای که در طول یک سال سه بار خون اهدا کرده بودند.

تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه گروههای مورد مطالعه از نظر میزان -Square فراوانی نسبی عوامل ویروسی ذکر شده، از آزمونهای آماری Chi t-test و students استفاده شد. در کلیه آزمونهای استفاده شده مقادیر  $p < 0.05$  به عنوان سطح آماری معنی‌دار در نظر گرفته شده است.

## یافته‌ها

در این مطالعه، در مجموع ۴۸۱۶ اهداکننده خون مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد ۶/۸۸٪ مرد و ۴/۱۱٪ زن بودند. میانگین سن اهداکنندگان ۳۲/۲±۰/۱ سال (۱۷-۶۵ سال) بوده است. ۶/۶٪ از اهداکنندگان متأهل و ۳/۳٪ از آنان مجرد بودند. درصد تأهل در اهداکنندگان زن بیش از اهداکنندگان مرد بوده است (به ترتیب ۷۰٪ و ۶۵٪). با وجود نامعلوم بودن سطح تحصیلات در ۶/۹٪ از اهداکنندگان، بیشترین فراوانی به افراد زیردیپلم و دیپلم اختصاص داشت (به ترتیب با ۲۹٪ و ۲۹٪). در مجموع ۶۰٪ از اهداکنندگان دارای سطح تحصیلات دیپلم و پایین تر بودند.

بیشترین تعداد اهداکنندگان در گروه شغلی آزاد، کارمند و کارگر قرار داشتند (به ترتیب ۲۷٪، ۱۷٪ و ۱۷٪).

۴۵٪ افراد در فاصله زمانی مطالعه برای اولین بار خون اهدا کرده بودند و ۴۵٪ افراد نیز از اهداکنندگان مستمر ★ خون بودند و سایر افراد شامل

جدول ۱: میزان شیوع کلی عوامل ویروسی بررسی شده در بین کلیه اهداکنندگان خون استان قزوین در سالهای ۸۳-۱۳۸۱ و مقایسه آنها در گروههای مختلف

	HBV (%)‡		HCV (%)†		تعداد (%)	مجموع
	p-value £	۰/۴۵۳	p-value §	۰/۱۵۱	۴۸۱۶	
۰/۴۰	۰/۴۶۳		۰/۷۷	۰/۱۴۸	(٪۸۸/۶) ۴۲۶۱۳	مرد
	۰/۳۸۴			۰/۱۶۹	(٪۱۱/۴) ۵۵۰۳	
۰/۰۰۲	۰/۵۳۳		۰/۱۱۴	(٪۴۲/۲) ۲۰۲۷۴	۱۳۸۱	زن
	۰/۴۶۴	۰/۱۶	۰/۱۷۴	(٪۳۹/۴) ۱۸۹۵۹	۱۳۸۲	
۰/۰۰۲	۰/۲۴۲		۰/۱۹۳	(٪۱۸/۴) ۸۷۸۳	۱۳۸۳	سال
	۰/۳۲۶	۰/۷۲	۰/۱۶۱	(٪۲۳/۷) ۱۶۲۰۸		
۰/۵۱۹	۰/۵۱۹		۰/۱۴۶	(٪۶۶/۳) ۳۱۹۰۸		متأهل
	۰/۳۷۵	۰/۹۴	۰/۱۹۸	* (٪۹/۶۴) ۱۸۲۷		
۰/۵۷	۰/۴۷۷		۰/۱۸۰	* (٪۹۱/۳۶) ۱۷۱۳۳	۱۳۸۲	زمان زلزله بهم دوره زمانی سایر روزهایی
	۰/۳۷۵	۰/۶۵	۰/۱۹۸	* (٪۹/۶۴) ۱۸۲۷		
۰/۴۱	۰/۷۶۲		۰/۱۱۷	** (٪۲/۴۹) ۵۰۵	۱۳۸۱	زمان زلزله بهم دوره زمانی دوره زمانی مشابه در ۱۳۸۱
	۰/۳۷۵					

‡: عفونت HCV تأیید شده با RIBA      §: آلودگی تأیید شده HBV

£: مقادیر  $p < 0.05$  نشان دهنده تفاوت در میزان آلودگی HCV در گروههای مشخص شده است.

§: مقادیر  $p < 0.05$  نشان دهنده تفاوت در میزان آلودگی HBV در گروههای مشخص شده است.

\*: درصد نسبت به خونهای اهدایی در سال ۱۳۸۲      \*\*: درصد نسبت به خونهای اهدایی در سال ۱۳۸۱

## بررسی شیوع عفونتهای ویروسی در اهداکنندگان خون در استان قزوین

پیدا کرده و در مقایسه با دوره مشابه در دی ۱۳۸۱ این میزانها به ترتیب ۲/۱ و ۷/۱ برابر افزایش یافته بود که در هر صورت نشان دهنده مراجعه اهداکنندگان بیشتر اهداکنندگان بار اول نسبت به اهداکنندگان مستمر است (جدول ۳).

جدول ۳: فراوانی گروههای مختلف انواع اهداکنندگان خون در استان قزوین در سالهای ۱۳۸۱-۸۳ و میزان شیوع عوامل ویروسی مورد بررسی در هر گروه

HBV (%)	HCV (%)	تعداد اهداکننده در زمان زلزله بم	تعداد کل (%)	
۰/۱۸۶	۰/۰۸۱	(٪۴۰/۲) ۷۳۲	(٪۴۵/۳) ۲۱۷۸۵	مستمر
۰/۷۲۸	۰/۲۱۸	(٪۵۴/۸) ۱۰۰۲	(٪۴۵) ۲۱۶۶۱	بار اول
۰/۴۵۵	۰/۱۶۴	(٪۴/۹) ۹۰	(٪۹/۷) ۴۶۷۰	دارای سابقه انتقال خون
۰/۴۵۳	۰/۱۵۱	(٪۱۰۰) ۱۸۲۷	(٪۱۰۰) ۴۸۱۱۶	مجموع

میزان آلودگی خونهای اهدایی با افزایش سطح تحصیلات اهداکنندگان سیرنزولی یافته است (جدول ۴) و نیز از نظر بررسی ارتباط گروههای شغلی تنها ارتباط موجود میزان بالاتر آلودگی HBs Ag در روحانیون مذهبی (٪۲/۱۰۱) نسبت به سایر اهداکنندگان (٪۰/۰۴۵۰) بوده است و میزان آلودگی ویروسی در سایر گروههای شغلی ارتباط آماری معنی داری را نشان نمی دهد (جدول ۵).

جدول ۴: فراوانی سطوح مختلف تحصیلی اهداکنندگان خون در استان قزوین در سالهای ۱۳۸۱-۸۳ و میزان شیوع عوامل ویروسی مورد بررسی در هر گروه

HBV (%)	HCV (%)	درصد	فراوانی	سطح تحصیلات
۰/۸۶۳	۰/۲۶۴	۱/۴	۶۸۲	بی سواد
۰/۴۱۸	۰/۱۵۶	۲۹/۲	۱۴۰۶۷	زیردیبلم
۰/۲۹۰	۰/۱۴۴	۲۹/۳	۱۴۱۰۱	دیبلم
۰/۳۲۸	۰/۱۸۰	۳/۱	۱۴۹۷	فوق دیبلم
۰/۲۹۴	۰/۰۶۹	۹/۱	۴۳۹۳	لیسانس
۰/۰۰۰	۰/۱۱۷	۰/۵	۲۵۶	فوق لیسانس
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۴	۱۸۷	دکترا و بالاتر
۰/۳۷۲	۰/۱۰۰	۲۶/۹	۱۲۹۲۸	نامعلوم
۰/۴۵۳	۰/۱۵۱	۱۰۰	۴۸۱۱۶	مجموع

### بحث

سالانه مقادیر زیادی خون از طرف اهداکنندگان به سیستم انتقال خون کشور وارد می شود که پس از فرآوریهای لازم، فرآوردهای خونی متعددی از آنها استخراج می گردد و برای مصارف درمانی به کار برده می شوند. در این مطالعه مشخص شد که حدود ۰/۵۸۶٪ خونهای اهدایی دارای حداقل یکی از آلودگیهای ویروسی هپاتیت B و C بودند؛

میانگین سنی اهداکنندگان دارای خونهای آلوده از نظر Ag HBs با اختلاف آماری معنی داری بیشتر از اهداکنندگان خونهای سالم بوده است ( $p<0/01$ ) (جدول ۲).

جدول ۲: توزیع سنی افراد دارای عوامل مثبت ویروسی و اهداکنندگان خون سالم در استان قزوین در سالهای ۱۳۸۱-۸۳

p-value	سن (میانگین ± انحراف معیار)	تعداد		مجموع
		۴۸۱۱۶	۲۲±۹/۸۴	
۰/۱۴	۳۱/۶۴±۹/۹۲	۷۳	مثبت	HCV
	۳۲/۱۸±۹/۸	۴۸۰۴۳	منفی	
۰/۰۰۲	۳۲/۸۱±۴۷/۱۰	۲۱۸	مثبت	HBV
	۳۲/۱۶±۹/۷۹	۴۷۸۹۸	منفی	

در بررسی خونهای آلوده از نظر سال اهدای خون، مشخص شد که در طول سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ میزان وجود خونهای آلوده به HBV در بین خونهای اهداشده به صورت معنی دار آماری سیرنزولی داشته است (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ میزان مثبت بودن خونهای آلوده از نظر HBs Ag به ترتیب ۰/۵۳۳٪، ۰/۲۲۲٪ و ۰/۴۶۴٪ بوده است،  $p=0/002$ )، ولی در مورد HCV Ab سیر تغییرات سالیانه به گونه دیگری است و در واقع میزان وجود خونهای آلوده در بین خونهای اهدایی از سال ۱۳۸۱ به سال ۱۳۸۳ تغییر معنی داری نداشته است.

در این مطالعه به صورت اختصاصی فراوانی خونهای آلوده در بین کلیه خونهای اهدایی، در مدت زمان مراجعه وسیع اهداکنندگان پس از زلزله بم (۱۶ دی ۱۳۸۲) با فراوانی خونهای آلوده در سایر دوره های زمانی سال ۱۳۸۲ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که میزان مثبت بودن خونهای آلوده از نظر Ag HBs و HCV Ab در این دوره زمانی (۱۶ دی ۱۳۸۲) به ترتیب ۰/۷۵٪ و ۰/۱۹۸٪ بوده است که با میزان به دست آمده در سایر روزهای سال ۱۳۸۲ تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد. همچنین فراوانی خونهای آلوده اهدایی در این مدت زمانی با مدت مشابه آن در سال ۱۳۸۱ (۱۶ دی ۱۳۸۱-۱۶ دی ۱۳۸۲) تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (جدول ۱).

با این حال نکته بارز این بود که تعداد خونهای اهدایی در دوره زمانی زلزله بم در سال ۱۳۸۲ (۱۸۲۷ مورد اهدای خون) با اختلاف آماری معنی داری بیش از تعداد خونهای اهدایی در دوره زمانی مشابه در سال ۱۳۸۱ (۵/۵۰۵ مورد اهدای خون) بوده است ( $p<0/01$ )؛ در حالی که این دوره زمانی ۱۱ روزه، ۳/۰۱٪ روزهای سال را به خود اختصاص می دهد. میزان خونهای اهدایی در این مدت زمانی ۹/۶۴٪ خونهای اهدایی در سال ۱۳۸۲ را تشکیل می دهد و ۳/۶۱٪ برابر بیش از خونهای اهدایی در دوره مشابه در سال ۱۳۸۱ است. میزان اهداکنندگان مستمر و بار اول در دوره زمانی زلزله بم نسبت به دوره ۱۱ روزه قبل از زلزله به ترتیب ۷/۶٪ و ۱۶/۷٪ برابر افزایش

## دکتر بزرگی و همکاران

احتمالی کاهش موارد مثبت خونهای آلوده به HBsAg می‌تواند راه اندازی سیستم جامع ثبت اطلاعات اهداکنندگان و کاهش موارد دریافت خون از افراد رد شده جهت اهدا، افراد پرخطر و افراد دارای نتایج مثبت ویروسی در دفعات قبلی اهدای خون باشد.

در این مطالعه جنسیت و تأهیل در مورد هیچ یک از عوامل ویروسی مورد بررسی به عنوان عامل خطر شناخته نشد و با وجود بالاتر رفتار احتمال آلودگی Ag HBs در افراد مسن‌تر، اهداکنندگان جوانتر میزان بالاتری از آلودگی HCV Ab HCV را نشان دادند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات اهداکنندگان، میزان آلودگی‌های ویروسی HCV و HBV سیر کاهشی معنی داری را نشان داد. این امر نشان می‌دهد که در هنگام غربالگری اهداکنندگان در مراکز دریافت خون، می‌توان به این عوامل به عنوان شاخصهای مؤثر نگاه کرد؛ البته از آنجایی که این یافته‌ها از اهداف فرعی مطالعه حاضر بودند، باید نقش مستقل آنها و میزان تاثیرشان در آلودگی فرآورده‌های خونی در مطالعه جداگانه‌ای مجددًا مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به تفکیک زیاد گروههای تحصیلی و شغلی در این مطالعه، توزیع افراد در گروههای تفکیک شده، به خصوص در مورد شغل، نامتناسب است؛ لذا این یافته در مورد شغل به عنوان یک یافته فرعی اهمیت بارزی ندارد و با توجه به فرعی بودن آن و عدم دقت زیاد آماری، این نکته برای بحث دقیق تر باید در مطالعات اختصاصی و دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

اهداکنندگان مستمر در این مطالعه بیش از ۴۵٪ افراد را تشکیل می‌دادند و میزان آلودگی در خونهای اهداگی آنان کمتر از سایر اهداکنندگان بود؛ بنابراین با افزایش میزان اهداکنندگان مستمر در بین کلیه اهداکنندگان، می‌توان به روش ساده‌ای برای کاهش خطر انتقال عفونت از طریق خون و فرآورده‌های خونی دست یافت.<sup>(۲۲-۲۴)</sup> در پانک اطلاعات اهداکنندگان در صورت تطابق شرایط اهداکننده با اهدای مستمر (۳ بار در سال) برچسب اهداکننده مستمر به فرد زده می‌شود. با این حال، در این افراد هم ممکن است به دلایل مختلف آلودگی ویروسی رخ دهد و در صورت اثبات وجود آلودگی، دیگر از این افراد خون گرفته نمی‌شود. با این حال نام این فرد در پانک داده اهداکنندگان همچنان به عنوان اهداکننده مستمر خواهد بود و تغییر نخواهد کرد. این امر دلیل وجود آلودگی در اهداکنندگان مستمر است. با این حال میزان آلودگی ویروسی در این افراد کمتر از سایر گروههای اهداکننده بوده است.

میزان اهدای خون در دوره زمانی وقوع زلزله به میزان قابل توجهی نسبت به دوره زمانی مشابه در سال قبل و نیز میزان متوسط اهدای خون در همان سال افزایش پیدا کرده بود و با وجود حجم زیاد خون اهدایی، تغییر معنی داری در میزان آلودگی‌های یافت شده در این مدت، در

جدول ۵: فراوانی گروههای مختلف شغلی اهداکنندگان خون در استان قزوین در سالهای ۱۳۸۱-۸۳ و میزان شیوع عوامل ویروسی مورد بررسی در هر گروه

شغل/حرفه	فراوانی	درصد	HCV (%)	HBs (%)
بیکار	۱۲۱۵	۲/۵	۰/۲۲۶	۰/۲۱۲
آزاد	۱۳۱۳۱	۲۷/۳	۰/۱۶۸	۰/۴۲۲
نظامی رسمی	۱۳۷۳	۲/۹	۰/۰۹۲	۰/۰۸۶
کارمند/مدیر	۸۵۴۵	۱۷/۸	۰/۱۰۷	۰/۳۵۱
دانش آموز	۲۲۹۹	۴/۸	۰/۱۴۳	۰/۴۱۰
خانه دار	۳۸۹۱	۸/۱	۰/۱۴۹	۰/۴۳۷
فرهنگی	۷۶۴	۱/۶	۰/۰۵۵	۰/۳۵۹
کارگر	۹۳۴۷	۱۷/۳	۰/۱۳۵	۰/۳۸۸
دانشجو	۳۰۲۸	۶/۳	۰/۱۰۵	۰/۲۰۳
راننده	۱۲۳۵	۲/۶	۰/۱۰۳	۰/۰۰۰
سریاز	۲۲۱۲	۴/۶	۰/۱۷۴	۰/۲۸۴
روحانی	۱۰۳	۰/۲	۰/۰۰۰	۲/۱۰۱
بازنیسته	۴۴۵	۰/۹	۰/۰۳۹	۰/۲۵۸
پژوهش	۹۳	۰/۲	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰
کشاورز	۱۶۳	۰/۳	۰/۲۷۴	۰/۰۰۰
فنی/مهندسی	۱۵۳	۰/۳	۰/۱۵۴	۰/۰۰۰
ناعلوم	۱۱۱۹	۲/۴	۰/۱۶۱	۰/۰۰۰
مجموع	۴۸۱۱۶	۱۰۰	۰/۱۵۱	۰/۴۵۳

ولی با توجه به میزان بالای خونهای اهدایی، همین شیوع کم نیز تعداد نسبتاً قابل توجهی از خونهای اهدایی (۲۸۲ مورد) را شامل می‌شود. همگی این خونها از چرخه انتقال خون خارج می‌شوند و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از انتقال عفونت به سایر افراد و مشاوره به اهداکننده آلوده انجام می‌گیرد. با این حال همچنان خطر انتقال عفونت به بیماران دریافت‌کننده خون و فرآورده‌های خونی پس از غربالگری‌های صورت گرفته و جود دارد و میزان آلودگی ۱/۵-۲ میلیون واحد خون و فرآورده انتقال یافته برآورد می‌شود.<sup>(۱۶-۱۸)</sup> احتمال وجود موارد منفی کاذب در آزمونهای غربالگری هپاتیت B و C در خونهای اهدایی، که حاکی از وجود ویروس در خونهای آماده تزریق می‌باشد، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد و بررسیهای دقیق‌تری در این خصوص به عمل آید.

در این مطالعه سیر تغییرات شیوع آلودگی‌های ویروسی در طی سه سال متولی مورد توجه قرار گرفت که مشخص شد میزان آلودگی به HBsAg در طی این سه سال دارای روند نزولی معنی داری بوده است؛ در حالی که این سیر نزولی در مورد HCV Ab مشاهده نشد. یکی از علل

شد و برای جایگزینی خونهای مورد استفاده به کار می‌رود تا از مراجعه بیش از حد مورد نیاز در یک دوره کوتاه زمانی خودداری کنند و در دوره زمانی طولانی‌تری برای اهدای خون مراجعه نمایند. (۲۳، ۱۱، ۹)

### نتیجه‌گیری

راه‌اندازی سیستم جامع ثبت اطلاعات اهداکنندگان و کاهش دریافت خون از افراد پرخطر و استفاده بیشتر از اهداکنندگان مستمر، می‌تواند در سلامت خون مؤثر باشد. گرچه افزایش معنی‌داری در میزان آلودگی خونهای دریافت شده در دوره زمانی وقوع زلزله بهم در استان قزوین مشاهده نشده است، ولی به دلیل بالاتر بودن اهداکنندگان بار اول، ضرورت تشویق آنان به اهدای مستمر مطرح است.

مقایسه با دوره‌های زمانی مشابه مشاهده نشد؛ در حالی که در مطالعه انجام‌شده در مورد سلامت خونهای اهدایی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، آلودگی ویروسی ۳ برابری‌شتر (از ۱/۰٪ قبل از واقعه به ۰/۳٪ پس از واقعه) گزارش شده است. (۲۱)، بنابراین همان طور که مشاهده می‌شود میزان آلودگی در مطالعه مابا میزان آلودگی ذکر شده در آمریکا تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. بیشترین تعداد مراجعین را در زمان بحران، در مطالعه ما و مطالعات مشابه، اهداکنندگان بار اول تشکیل می‌دهند که نشان داده شده است این افراد در دوره‌های پس از بحران به میزان کمتری تمایل به اهدای مجدد خون دارند (۱۹-۲۱) و این امر لزوم آموزش در حین خونگیری در زمان بحران در مورد اهمیت استمرار اهدای خون را نشان می‌دهد و همچنین در این زمان باید به مردم آموزش داده شود که خونهای دریافتی از آنها بلا فاصله مصرف نخواهد

## References

- 1- McClelland B, Contreras M. Appropriateness and safety of blood transfusion. *BMJ* 2005; 330: 104-5.
- 2- Satake M. Infectious risks associated with the transfusion of blood components and pathogen inactivation in Japan. *Int J Hematol* 2004; 80: 306-10.
- 3- Biedrycki BA. Blood transfusions: is "safest ever" safe enough? *ONS News* 2004; 19: 8-9.
- 4- Vyas GN, Rawal BD, Busch MP. The Risk of HIV Transmission by Screened Blood. *N Engl J Med* 1996; 334: 992-3.
- 5- Petersen LR, Doll LS, White CR, Johnson E, Williams A. HIV Blood Donors Study Group. Heterosexually acquired human immunodeficiency virus infection and the United States blood supply: considerations for screening of potential blood donors. *Transfusion* 1993; 33: 552-7.
- 6- Goodnough LT, Brecher ME, Kanter MH, AuBuchon JP. Transfusion medicine. *N Engl J Med* 1999; 340: 438-46.
- 7- Lackritz EM, Satten GA, Aberle-Grasse J, Dodd RY, Raimondi VP, Janssen RS, et al. Estimated risk of transmission of the human immunodeficiency virus by screened blood in the United States. *N Engl J Med* 1995; 333: 1721-5.
- 8- Mungai M, Tegtmeier G, Chamberland M, Parise M. Transfusion-transmitted malaria in United States from 1963 through 1999. *N Engl J Med* 2001; 344: 1973-8.
- 9- Alavian SM, Kafaee J, YektaParast B, Hajarizadeh B, Doroudi T. The efficacy of blood donor screening in reducing the incidence of hepatitis C virus infection among thalassemic patients in Iran. *Transfusion Today* 2002; 53: 3-4.
- 10- Alavian SM, Gholami B, Massarat S. Hepatitis C risk factors in Iranian volunteer blood donors: a case-control study. *J Gastroenterol Hepatol* 2002; 17: 1092-7.
- 11- Abolghasemi H, Kheirkhah M, Hosseini SM. Survey of the reasons for the deferral of blood donors in Tehran Blood Transfusion Center. *Hakim* 2002; 5: 119-25.
- 12- Saneie-Moghadam E, Khosravi S, Salehi M, Khaleghi-Moghadam M, Ghasri M, Yaghoobnejad-Moghadam Z. Studying RPR, anti-HIV, and HBsAg in rejected blood donors with history of cupping (Hajamat). 11th Iranian Congress of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Tehran, Iran; Feb 24-28, 2003: 179.
- 13- Ghavanini AA, Sabri MR. Hepatitis B surface antigen and anti-hepatitis C antibodies among blood donors in the Islamic Republic of Iran. *East Mediterr Health J* 2000; 6: 111.
- 14- Lewis WF, Dodd RY. Trends in prevalence of HIV infection among U.S. blood donors. *Transfusion* 1992; 32: 56S.
- 15- Glynn SA, Kleinman SH, Schreiber GB, Busch MP, Wright DJ, Smith JW, et al. Trends in incidence and prevalence of major transfusion-transmissible viral infections in US blood donors, 1991 to 1996. *JAMA* 2000; 284: 229-35.
- 16- Dodd RY. Emerging infections, transfusion safety and epidemiology. *N Engl J Med* 2003; 349: 1205-6.
- 17- Sellors JW, Hayward R, Swanson G, Ali A, Haynes RB, Bourque R, et al. Comparison of deferral rates using a

- computerized versus written blood donor questionnaire: a randomized, cross-over study. *BMC Public Health* 2002; 2: 14.
- 18- Stramer SL, Glynn SA, Kleinman SH, Strong M, Caglioti S, Wright DJ, *et al.* Detection of HIV-1 and HCV Infections among Antibody-Negative Blood Donors by Nucleic Acid-Amplification Testing. *N Engl J Med* 2004; 35: 760-8.
  - 19- Glynn SA, Busch MP, Schreiber GB, Murphy EL, Wright DJ, Tu Y, *et al.* Effect of a national disaster on blood supply and safety: the September 11 experience. *JAMA* 2003; 289: 2246-53.
  - 20- Sandler SG, Ouellette GJ. Transportation and other blood system issues related to disasters: Washington, DC experience of September 11, 2002. *Vox Sang* 2002; 83: 367-70.
  - 21- Dodd RY, Orton SL, Notari EP, Stramer SL. Viral marker rates among blood donors before and after the terrorist attacks on the United States on September 11, 2001. *Transfusion* 2002; 42: 1240-1.
  - 22- Linden JV, Davey RJ, Burch JW. The September 11, 2001 disaster and the New York blood supply. *Transfusion* 2002; 42: 1385-7.
  - 23- Schmidt PJ. Blood and disaster--supply and demand. *N Engl J Med* 2002; 346: 617-20.
  - 24- Gevirtz C. Blood and disaster. *N Engl J Med* 2002; 347: 68-9.
  - 25- Busch MP, Guiltinan A, Skettino S, Cordell R, Zeger G, Kleinman S. Safety of blood donations following a natural disaster. *Transfusion* 1991; 31: 719-23.
  - 26- Klein HG. earthquake in America. *Transfusion* 2001; 41: 1179-80.

## **Study of Viral Infections Prevalence in Blood Donors of Qazvin Province in Different Time Intervals and During Bam Earthquake**

**Bozorgi SH**

Iran Blood Transfusion Organization Research Center,  
Qazvin Blood Transfusion Center

**Ahmadzad Asl M**

Nikan Health Researchers Institute, Tehran Hepatitis Center

**Ramezani H**

Iran Blood Transfusion Organization Research Center,  
Qazvin Blood Transfusion Center

**Kargarfard H**

Iran Blood Transfusion Organization Research Center,  
Qazvin Blood Transfusion Center

**Alavian SM**

Baqiyatallah University of Medical Sciences, Liver and Gastroenterology Research Center, Tehran Hepatitis Center

**Corresponding Author:**

Seyed Moayed Alavian M.D.,  
P.O.Box: 14155-3651, Tehran,  
Iran.

Tel: +98 21 88055752

E-mail: editor@hepmon.ir

### **ABSTRACT**

**Background:** Safety of Blood products and plasma derivates is one of main concerns in transfusion sector. Screening of donated blood became an emerging item to large extent because of Hepatitis C and B virus, (HCV, HBV) and HIV epidemics especially in blood donation campaign following disasters. In this study we aim to evaluate the pattern of variation of viral infection markers donated at three consecutive year and during Bam earthquake disaster.

**Materials and Methods:** Using donors' electronic information system in Qazvin province of Iran, all data about demographic characteristics and HCV, HBV markers were assessed and analyzed with SPSS software. Time period of 11 days after Bam disaster in 2003 was compared with similar period in 2002.

**Results:** Prevalence of HBV and HCV contamination in donated bloods were 0.45 and 0.15 percent respectively and there was no differences regarding gender and marital status. Consecutive blood donors (45.3 percent of subjects) had lower rate of infection compared with others ( $p<0.05$ ). HBV infection had a significant descending rate in three years but there was no similar pattern regarding HCV. Despite 3.6 times increase in blood donation rate the contamination rate during Bam disaster had no differences with similar time period in previous year.

**Conclusion:** Decrease in HBV infection prevalence may be the result of installation of donors' electronic information system in second year of study. Despite the fact of no increase in prevalence of blood contamination, it is necessary to close monitoring of blood donation during disaster to ensure blood safety. *Govareh/Vol. 11, No. 4, Winter 2006; 242-248*

**Keywords:** Blood donation, Blood safety, Data registry system, Disaster, Annual variations